

MILUPA BASIC-CH

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při poruchách metabolismu sacharidů (např. glukózo-galaktózová malabsorpce, deficit pyruvát dehydrogenázy a deficit GLUT1) u kojenců a dětí. Směs bílkovin, tuků, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků s velmi nízkým obsahem sacharidů, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Používejte pouze pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro kojení a děti.

Doporučený příjem: Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.

Příprava a použití: Příprava 100 ml výživy: 90 ml vody + 2 zarovnané odměrky prášku (7 g) pro dosažení doporučené koncentrace výživy (7 % obj.). Osmolalita při této koncentraci je 70 mOsmol/kg H₂O. **PRO ZDRAVÍ KOJENCE JE DŮLEŽITÉ PEČLIVÉ DODRŽOVAT NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NESPRÁVNOU PŘÍPRAVOU MŮŽETE OHROZIT ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE.**

1. Umyjte si pečlivě ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vysterylizujte láhve a savičky.
2. Čerstvou vodu určenou pro kojení převařte po dobu 5 minut nebo dokud rychlovarná konvice nevypne. Prášek musí být rozmíchán v horké vodě (>50 °C), aby se úplně rozpustil. Změřte teplotu pomocí teploměru.
3. 1/3 potřebného množství vody nalijte do vysterylizované lahvičky.
4. Přiloženou odměrku naplňte práškem a zarovnejte ji čistým a suchým nožem. Prášek v odměrce nestlačujte. Vždy používejte pouze přiloženou odměrku.
5. Předepsaný počet odměrek přidejte do vody. Láhev uzavřete a důkladně protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Přidejte zbytek vody a znovu protřepejte. Pokud je třeba, do čerstvě připravené výživy lze přidat vhodný zdroj sacharidů, poté výživu znovu protřepejte. Před podáváním zkontrolujte teplotu výživy kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí.
6. Podávejte ihned po přípravě. Pokud výživu nespotebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah láhve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přehřívat.

Upozornění: Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu připravujte vždy těsně před podáváním. Výživu nepřevařujte a nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřívání výživy. Sledujte celkový příjem vitamínů, minerálních látek a stopových prvků, abyste zajistili jejich optimální příjem. V závislosti na dávkování tohoto přípravku a příjmu jiných zdrojů výživy může být nezbytné další doplnění mikronutrientů.

Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním krmení jsou zuby vyčištěny. V případě potřeby se informujte u svého zubního lékaře.

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah spotřebujte do 4 týdnů po otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: rostlinné oleje (palmový, slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový, slunečnicový), kaseinát sodný (z kravského mléka), kaseinát vápenatý (z kravského mléka), fosforečnan vápenatý, citronan draselný, rybí olej, chlorid draselný, olej z plísňe *Mortierella alpina*, síran hořečnatý, citronan vápenatý, cholin chlorid, kyselina L-askorbová, chlorid sodný, cholin bitartrát, emulgátor (slunečnicový lecitin), L-cystin, chlorid vápenatý, taurin, inositol, síran železnatý, síran zinečnatý, L-karnitin, antioxidant (askorbyl-palmitát), nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, síran manganatý, riboflavin, síran měďnatý, thiamin-mononitrat, kyselina pteroylmonoglutamová, retinyl-acetát, pyridoxin-hydrochlorid, jodid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

Průměrný obsah	ve 100 g prášku:	ve 100 ml výživy:*	Průměrný obsah	ve 100 g prášku:	ve 100 ml výživy:*
Energetická hodnota	2788 kJ	195 kJ	Vápník	896 mg	62,7 mg
	674 kcal	47 kcal	Fosfor	490 mg	34,3 mg
Tuky	62,0 g	4,3 g	Hořčík	84,3 mg	5,90 mg
z toho			Železo	7,80 mg	0,55 mg
Nasycené mastné kyseliny	23,6 g	1,7 g	Zinek	8,10 mg	0,57 mg
Mononenasycené mastné kyseliny	28,2 g	2,0 g	Měď	0,67 mg	0,047 mg
Polynenasycené mastné kyseliny	10,1 g	0,71 g	Mangan	0,10 mg	0,007 mg
- Kyselina arachidonová (AA)	0,27 g	18,8 mg	Molybden	40,3 µg	2,82 µg
- Kyselina dokosaheptaenová (DHA)	0,27 g	18,8 mg	Selen	31,0 µg	2,17 µg
Sacharidy	<0,14 g	<0,01 g	Chrom	32,2 µg	2,25 µg
z toho cukry	<0,10 g	<0,01 g	Jód	170 µg	11,9 µg
Vláknina	0 g	0 g	Jiné		
Bílkoviny	28,6 g	2,0 g	L-karnitin	15,8 mg	1,11 mg
Sůl	0,86 g	0,06 g	Cholin	270 mg	18,9 mg
Vitaminy			Inositol	58,6 mg	4,10 mg
Vitamin A	914 µg	64,0 µg	Taurin	62,6 mg	4,38 mg
Vitamin D	20,3 µg	1,42 µg			
Vitamin E	16,2 mg (α-TE)	1,13 mg (α-TE)			
Vitamin K	45,0 µg	3,15 µg			
Thiamin	0,99 mg	0,07 mg			
Riboflavin	1,62 mg	0,11 mg			
Niacin	9,72 mg	0,68 mg			
	(16,2 mg NE)	(1,14 mg NE)			
Kyselina pantothenová	5,73 mg	0,40 mg			
Vitamin B ₆	0,73 mg	0,05 mg			
Kyselina listová	114 µg	7,98 µg			
Folát	195 µg	13,6 µg			
Vitamin B ₁₂	2,10 µg	0,15 µg			
Biotin	29,2 µg	2,04 µg			
Vitamin C	123 mg	8,61 mg			
Minerální látky a stopové prvky					
Sodík	343 mg	24,0 mg			
Draslík	915 mg	64,1 mg			
Chlorid	660 mg	46,2 mg			

* Při doporučené koncentraci (7 % obj.).

Výrobce: Milupa GmbH,
Schleyerstrasse 4, 36041 Fulda, Německo.

Kontakt pro ČR: Danone a.s.,
V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov,
infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz



NUT1510, SAP etikety: 205889

Obsah: 300 g